

09.02.2011

□□□□□□□□ SAPTAMANA EUROPEANA DE PREVENIRE A

□□□□□□□□□□□□□□ CANCERULUI □ DE COL UTERIN

Cancerul de col uterin este al doilea ca frecventa intre toate tipurile de cancer in intreaga lume , primul loc fiind ocupat de cancerul de san

Pretutindeni in lume, la fiecare doua minute o femeie moare din cauza cancerului de col uterin. In Romania situatia este cu atat mai trista cu cat cazurile de cancer sunt descoperite in stadii avansate. Din pricina problemele sociale si economice romanii nu isi fac controale periodice si ajung la medic numai cand boala este deja intr-un stadiu final.

Ca in cazul majoritatii cancerelor (90% din ele), este vorba de un carcinom, adica de o tumora ce se dezvolta pornind de la tesutul de acoperire numit epiteliu.

Cancerul de col uterin afecteaza cel mai frecvent femeile tinere (35-50de ani) in perioada de activitate genitla, in timp ce cancerul de corp uterin, mai rar, apare mai ales la menopauza

Colul uterin este o zona de tranzitie intre vagin si uter. Practic este un fel de inel care delimiteaza partea superioara a vaginului de partea inferioara a uterului. Vaginul are o structura diferita fata de cea a uterului (au tipuri diferite de celule). Colul uterin, fiind situat intre cele doua nu stie ce fel de structura sa adopte. Prin urmare, osciland intre cele doua tipuri este predispus la schimbari. Aceasta predispozitie il face sensibil si in fata modificarilor de tip cancerigen, adica displazia. Altfel spus pot aparea una sau mai multe celule altfel decat celelalte care se comporta si se inmultesc diferit fata de restul celulelor organismului si formeaza o tumora.

Factori favorizanti in aparitia cancerului de col uterin

1. HPV

Cauza numărul unu de apariție a cancerului de col uterin este infecția cu virusul uman Papilloma (HPV). Virusul este foarte răspândit și se transmite extrem de ușor astfel că aproximativ 75% din femeile active sexuale iau virusul. Din fericire numai o parte din acestea fac cancer, restul având un sistem imunitar suficient de puternic care poate lupta împotriva virusului și îl poate omori.

2. Viața sexuală începută devreme

3. Parteneri sexuali multipli

4. Femei cu mai mult de 5 sarcini

5. Se pare că și fumatul are un rol favorizant în apariția cancerului de col uterin

Leziunile precanceroase

Apariția acestui cancer este precedată de leziuni denumite displazii (transformare anormală) ale colului uterin. Aceste displazii pot fi depistate precoce și pot fi tratate, evitând astfel evoluția spre cancer. În absența tratamentului, aceste displazii pot evolua spre cancer localizat, care poate, în 10-15 ani, să se extindă la organele vecine (vagin, vezică urinară). În acest fel cancerul devine invaziv.

Simptome.

Din păcate adeseori, nu se manifestă prin nici un semn. Totuși, sangerările anormale (metroragii) după raportul sexual și secreția albicioasă (leucoree) cu striuri de sange sunt semne care trebuie să alarmeze orice femeie. La examenul ginecologic, medicul va aprecia aspectul leziunilor și va recomanda, dacă este necesar, depistarea cu ajutorul unui frotiu.

Diagnostic.

În cazul depistării unui frotiu anormal, trebuie efectuat un examen amănunțit al colului uterin (colposcopie), pentru a observa zonele suspecte ale colului și a se recolta țesut (biopsie). Examenul celulelor acestui țesut permite să se aprecieze dacă leziunile sunt benigne, precanceroase sau canceroase.

Tratamentul depinde de stadiul de evoluție a leziunilor

- în stadiul de simple leziuni precanceroase, țesutul anormal este distrus (laser, distrucție prin refrigerare sau prin curent electric);
- în stadiul de leziuni precanceroase (displazii) severe, intervenția denumită conizație, constă în ablația (înlăturarea) unei porțiuni conice spre baza colului;
- în stadiul de cancer mai avansat (cancer invaziv), tratamentele depind de stadiul extensiei cancerului. Se recurge la intervenție chirurgicală, la radioterapie și, eventual, la chimioterapie, utilizate singure sau combinate, în funcție de situație.

Dr Gandacioiu Cristiana

Promovarea Sanatatii