

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

RÂMNICU VÂLCEA Str. DECEBAL Nr. 4A ; Tel. 0250 747720 ; Fax 0250 746504; int 145;144;133.

e-mail : epidvalcea@aspjvalcea.ro ; aspj.valcea@aspjvalcea.ro ; www.aspjvalcea.ro

In conformitate cu ORD MS 386/2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015- 2016 , se aplica urmatorul calendar national de vaccinare:

Varsta recomandata

Tipul de vaccinare

Comentarii

primele 24 ore

2-7 zile

Vaccin hepatitic B (Hep B)

Vaccin de tip Calmette Guérin (BCG)

In maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelu-lar-poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B

(DTPa-VPI-Hib-Hep B)

Vaccin pneumococic conjugat

1

Medicul de familie

4 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic B

(DTPa-VPI-Hib-Hep B)

Vaccin pneumococic conjugat

1

Medicul de familie

11 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic B

(DTPa-VPI-Hib-Hep B)

Vaccin pneumococic conjugat

1

Medicul de familie

12 luni

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

(ROR)

Medicul de familie

5 ani

7 ani

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

(ROR)

Medicul de familie

6 ani

2

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelu²lar-poliomielitic (DTPa-VPI)/VPI

Medicul de familie

8 ani

3

VPI

3

Medicul de familie

14 ani

Vaccin diftero-tetanic pentru adulti/ vaccino-diftero-tetano-pertussis acelar

Medicul de familie

NOTA :

¹ Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus in calendarul national de vaccinare in functie de fondurile disponibile

² Copiii cu varsta de 6 ani care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI, iar cei care nu au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa vor fi vaccinati cu DTPa-VPI

³ Copiii cu varsta de 8 ani care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI in 2015 (copii care nu au fost scolarizati in clasa pregatitoare)

Aceasta recuperare se aplica numai in anul 2015.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica utilizare.

1. Obiectivul principal : pana la varsta de 18 luni orice copil trebuie sa fie vaccinat cu minimum 3 doze HB si 3 doze DTPa-VPI si Hib

2. Vaccinare cu vaccin hexavalent la 11 luni se va face incepand cu copiii care nu au primit acest vaccin la varsta de 6 luni .