

COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE

**RÂMNICU VÂLCEA Str. DECEBAL Nr. 4A ; Tel. 0250 747720 ; Fax 0250 746504; int  
145;144;133.**

*e-mail* : [epidvalcea@aspjvalcea.ro](mailto:epidvalcea@aspjvalcea.ro) ; [aspj.valcea@aspjvalcea.ro](mailto:aspj.valcea@aspjvalcea.ro) ; [www.aspjvalcea.ro](http://www.aspjvalcea.ro)

In conformitate cu ORD MS 386/2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015- 2016 , se aplica urmatorul calendar national de vaccinare:

Varsta recomandata

Tipul de vaccinare

Comentarii

primele 24 ore

2-7 zile

Vaccin hepatitic B ( Hep B )

Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)

In maternitate

2 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acellular-poliomielitic-Haemophilus B- hepatitic B

( DTPa-VPI-Hib-Hep B )

Vaccin pneumococic conjugat 1

Medicul de familie

4 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B hepatic B

( DTPa-VPI-Hib-Hep B )

Vaccin pneumococic conjugat 1

Medicul de familie

11 luni

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B hepatic B

( DTPa-VPI-Hib-Hep B )

Vaccin pneumococic conjugat <sup>1</sup>

Medicul de familie

12 luni

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

( ROR)

Medicul de familie

5 ani

7 ani

Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion

( ROR)

Medicul de familie

6 ani 2

Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic ( DTPa-VPI)/VPI

Medicul de familie

8 ani 3

VPI 3

Medicul de familie

14 ani

Vaccin diftero-tetanic pentru adulti/ vaccine diftero-tetano-pertussis acelular

Medicul de familie

NOTA :

<sup>1</sup> Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus in calendarul national de vaccinare in functie de fondurile disponibile

<sup>2</sup> Copiii cu varsta de 6 ani care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI, iar cei care nu au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa vor fi vaccinati cu DTPa-VPI

<sup>3</sup> Copiii cu varsta de 8 ani care au in antecedentele vaccinale o doza de DTPa la 4 ani vor fi vaccinati cu VPI in 2015 ( copiii care nu au fost scolarizati in clasa pregatitoare)

Aceasta recuperare se aplica numai in anul 2015.

*Pentru administrarea tuturor vaccinurilor mentionate se vor utiliza numai seringi de unica utilizare.*

1. Obiectivul principal : pana la varsta de 18 luni orice copil trebuie sa fie vaccinat cu minimum 3 doze HB si 3 doze DTPa-VPI si Hib

2. Vaccinare cu vaccin hexavalent la 11 luni se va face incepand cu copiii care nu au primit acest vaccin la varsta de 6 luni .