

**17 NOIEMBRIE ZIUA DE ACȚIUNE
PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL
UTERIN**
Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

17 noiembrie 2020

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
a lansat

**Strategia Globală pentru eliminarea cancerului de
col uterin**

printr-o rezoluție adoptată de 194 de țări.

Obiectiv: până în anul 2030 incidența cancerului de
col uterin să scadă și să se mențină la
sub 4 cazuri noi la 100.000 de femei.

Atingerea obiectivului ar fi posibilă dacă sunt
îndeplinite 3 ținte esențiale:

■ 90% din fetițe să
fie vaccinate
împotriva HPV
până la împlinirea
vârstei de 15 ani

■ 70% din femeile
adulte să fie testate
cu un test de înaltă
performanță de două
ori în intervalul de
vârstă 35-45 ani


■ 90% din femeile cu
teste pozitive să
beneficieze de
tratament al leziunilor
pre-canceroase și al
celor maligne

90%

70%

90%

România are cea mai ridicată
incidență și mortalitate prin cancer de col uterin
în Uniunea Europeană (2020)



Incidența și mortalitatea prin cancer de col uterin în țările UE, 2022,
ASR/‰00 femei (raportat la populația standard europeană 2013)
[https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-
Nov_2021.pdf](https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/factsheets/cervical_cancer_en-Nov_2021.pdf)

**Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a
adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării
cancerului de col uterin ca
problemă de sănătate publică până în 2030.**

CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

1 Prevenirea prin vaccinare
Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung
împotriva cancerului cervical.

**2 Screening și tratament
al leziunilor pre-canceroase**
Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-
canceroase în cancer.

**3 Tratamentul precoce pentru
cancerul cervical invaziv**
Poate salva vieți!

*Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă
și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare
a sănătății și educație pentru sănătate al
Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

17 NOIEMBRIE 2023

ZIUA DE ACȚIUNE

**PENTRU
ELIMINAREA CANCERULUI DE COL
UTERIN**

**Informează-te!
Testează-te!
Vaccinează-te!**



Material adresat populației generale




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CE ESTE cancerul de col uterin (cancerul cervical)?



Cancerul care apare în celulele colului uterin (partea inferioară a uterului care se conectează la vagin) din cauza înmulțirii necontrolate, haotice, a unor celule anormale, cel mai frecvent în prezența HPV.

CINE ESTE LA RISC de a dezvolta cancer cervical?

- ✓ Toate femeile care și-au început viața sexuală, sunt la risc de a dezvolta cancer cervical.
- ✓ Cel mai frecvent femei în vârstă de 35-44 ani

CE SIMPTOME ARE cancerul de col uterin?

- ✓ În mod obișnuit nu există simptome în stadiile precoce.
- ✓ Când apar, simptomele pot include:
 - ❖ Sângerări vaginale anormale
 - ❖ Scurgeri vaginale anormale
 - ❖ Durere la contactul sexual
- ✓ Aceste simptome apar și în alte afecțiuni, fără a semnifica neapărat un cancer de col uterin.
- ✓ În cazul în care apar, adresați-vă imediat medicului!

CARE ESTE CAUZA cancerului de col uterin?

- ✓ Peste 90% dintre cazuri sunt determinate de infecția cu HPV
- ✓ HPV se transmite în special prin contact sexual.
- ✓ 8 persoane din 10 se infectează cu HPV în cursul vieții.
- ✓ În majoritatea cazurilor infecția se va vindeca de la sine, și nu vor dezvolta niciodată cancer cervical.
- ✓ Uneori, infecția HPV persistă și poate produce leziuni, veruci (condiloame) genitale sau leziuni precanceroase.
- ✓ Tipurile de HPV care produc veruci sunt diferite de tipurile de HPV care pot produce cancer.
- ✓ Între infecția cu HPV și apariția cancerului de col uterin pot trece mulți ani (chiar zeci).
- ✓ Infecția cu HPV nu prezintă simptome.

CANCERUL DE COL UTERIN POATE FI PREVENIT? Da, cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare anti HPV și screening!



Vaccinarea și screening-ul pot salva vieți!

Infecția HPV poate cauza și dezvoltarea cancerelor de:

- ✓ organe genitale (vagin, vulva sau penis), anus
- ✓ orofaringeale (cancere ale gurii, ale corzilor vocale).

INFECȚIA CU HPV poate fi tratată?

- ✓ Nu există tratament specific pentru infecția cu HPV.
- ✓ Pot fi tratate doar efectele produse de infecția HPV.

HPV nu înseamnă HIV

- ✓ Virusul Papilloma Uman (HPV) și Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) sunt virusuri foarte diferite
- ✓ HPV și HIV provoacă probleme de sănătate diferite.

VACCINAREA anti – HPV

pentru prevenirea cancerului de col uterin

- ✓ Vaccinul antiHPV oferă protecție împotriva formelor invazive de cancer cauzate de HPV.
- ✓ Riscul de infecție este la fel de mare în cazul fetelor și al băieților.
- ✓ Momentul optim pentru vaccinare este înaintea debutului activității sexuale (înaintea apariției riscului de infecție HPV)

În România, vaccinarea anti HPV este:

- ✓ **GRATUITĂ** pentru fete și băieți între 11 ani și 19 ani
- ✓ **COMPENSATĂ 50%** pentru femei între 19 ani și 45 de ani

SCREENING-UL

pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului de col uterin

- ✓ Screeningul reprezintă testarea periodică, la intervale regulate, a tuturor femeilor din grupa de vârstă la risc (25 – 64 ani) pentru depistarea leziunilor precanceroase;
- ✓ Dacă apar leziuni precanceroase, acestea pot fi tratate și nu vor mai evolua către cancer, prevenind astfel apariția cancerului de col uterin!

RECOMANDĂRI SCREENING

- ✓ Femei între 25-29 ani: testul Babeș Papanicolaou
- ✓ Femei între 30- 64 ani: testul HPV
- ✓ Test efectuat o dată la fiecare 5 ani

**Dacă aveți între 25 și 64 de ani adresați-vă
programelor de screening organizat populațional al
cancerului de col uterin pentru un test gratuit!**

**Cancerul de col uterin poate fi prevenit prin vaccinare și screening
și poate fi vindecat dacă este depistat la timp și tratat corespunzător!**

17 NOIEMBRIE
ZIUA DE ACȚIUNE
PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN
Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

Anual, în lume, sunt
DIAGNOSTICATE
PESTE
600.000
cazuri.

RATA SUPRAVIETUIRII LA 5 ANI

DIAGNOSTIC
PRECOCE



DIAGNOSTIC
ÎN STADII AVANSATE



CINE ESTE LA RISC DE A DEZVOLTA CANCER DE COL UTERIN?

Toate femeile, indiferent
de rasă/etnie sunt la risc
de a dezvolta cancer de
col uterin



CEL MAI FRECVENT SUNT
DIAGNOSTICATE FEMEI ÎN
VÂRSTĂ DE
35-44 ANI

CE CAUZEAZĂ CANCERUL
DE COL UTERIN?

CEA MAI COMUNĂ CAUZĂ
HPV (HUMAN PAPILOMAVIRUS)



Peste 90% din cancerele de
col uterin sunt cauzate de
infecția cu HPV
Peste 80% din persoane se
infectează cu HPV în cursul
vieții, dar majoritatea nu
vor dezvolta cancer de col
uterin

CARE SUNT
SIMPTOMELE?

În mod obișnuit nu
există simptome în
stadiile precoce de
cancer de col uterin

ODATĂ CE CANCERUL
AVANSEAZĂ

Simptomele pot include:

SÂNGERĂRI VAGINALE
ANORMALE

SCURGERI VAGINALE
ANORMALE

DURERE LA CONTACTUL
SEXUAL

DE CE ESTE
SCREENING-UL
CRUCIAL?

6 DIN 10
CANCERELE DE
COL UTERIN


SUNT DEPISTATE LA
FEMEI CARE NU AU
FĂCUT NICIODATĂ UN
TEST
BABEȘ-PAPANICOLAU
sau nu au fost testate în
ultimii 5 ani.



17 NOIEMBRIE ZIUA DE ACȚIUNE PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

A




Mai mult de

85%

**DINTRE FEMEILE
AFECTATE SUNT TINERE,**
cu educație scăzută, din
comunitățile cele mai
sărace din lume.

B



90%

**DINTRE DECESE, se
produc în țările cu
venituri mici și
mijlocii.**

Incidența standardizată pe vârstă (A) și ratele mortalității (B) cancerului de col uterin în funcție de țară în 2020


Baza de date GLOBOCAN, Agenția Internațională pentru Cercetare în Cancer (IARC), the Global Cancer Observatory

Anual, la nivel
mondial sunt
**DIAGNOSTICATE
PESTE**

600.000

Cazuri.

19



19 din 20 cele
mai afectate
țări sunt în
Africa.

Cancerul de col uterin
OMOARĂ MAI MULT DE

300.000

FEMEI ÎN FIECARE AN.

Numărul anual
de cazuri noi
VA CREȘTE LA

700.000

Cazuri

SE ESTIMEAZĂ
că fără acțiuni
**PÂNĂ ÎN
2030**

Numărul anual de
decese
VA CREȘTE LA

400.000

Cazuri



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

17 NOIEMBRIE ZIUA ACȚIUNII PENTRU ELIMINAREA CANCERULUI DE COL UTERIN

Informează-te! Testează-te! Vaccinează-te!

Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a adoptat Strategia globală de accelerare a eliminării cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

CEI 3 PILONI AI STRATEGIEI OMS

1

Prevenirea prin vaccinare

Vaccinarea HPV asigură protecția pe termen lung împotriva cancerului cervical.

2

Screening și tratament al leziunilor pre-canceroase

Pot preveni dezvoltarea leziunilor pre-canceroase în cancer.

3

Tratamentul precoce pentru cancerul cervical invaziv

Poate salva vieți!

* Pentru a elimina cancerul cervical, toate țările trebuie să atingă și să mențină o incidență sub 4 cazuri per 100 000 femei.

Cancerul de col uterin este dat de creșterea necontrolată a unor celule anormale în mucoasa colului uterin.

Cele mai multe cazuri se datorează infecției persistente cu HPV

Număr cazuri noi cancer de col uterin pe 100000 femei*

Incidența estimată - UE 27, femei, toate vârstele 2020

5.7 - 11.0
11.0 - 16.3
16.3 - 21.7
21.7 - 27.0
27.0 - 32.3

*populație europeană standard 2013

Decese prin cancer de col uterin pe 100000 femei*

Mortalitate estimată - UE 27, femei, toate vârstele 2020

2.1 - 5.1
5.1 - 8.0
8.0 - 11.0
11.0 - 13.9
13.9 - 16.9

*populație europeană standard 2013

România are cea mai ridicată incidență și mortalitate prin cancer de col uterin în Uniunea Europeană, 2020

Obiectivele Strategiei Globale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin – OMS

- 90% din fetițe complet vaccinate împotriva HPV până la împlinirea vârstei de 15 ani

- 70% din femeile adulte testate cu un test de înaltă performanță de două ori în intervalul de vârstă 35-45 ani

- 90% din femeile diagnosticate cu leziuni precanceroase sau cancer de col uterin tratate corect și la timp

90%

70%

90%



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ