

<p><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt; mso-ansi-language: IT;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA;" lang="IT"> </p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">BOALA LYME- ◆◆>>> INFORMATII PENTRU PUBLIC</p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin:
0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin:
0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin:
0in 0in 0pt;">◆</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt; mso-ansi-language: PT-BR;
mso-bidi-font-family: Arial;" lang="PT-BR">Metodologia de supraveghere a Bolii Lyme
(transmisă prin capusă)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in
0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt; mso-ansi-language: PT-BR;
mso-bidi-font-family: Arial;" lang="PT-BR">(actualizare - ianuarie 2012)</p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size:
11pt; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Arial;" lang="PT-BR"> </p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size:
11pt; mso-ansi-language: PT-BR; mso-bidi-font-family: Arial;" lang="PT-BR">I. Boala Lyme este
o boală transmisibilă cuprinsă în HG 589/2007, cu raportare pe ◆fișa unică de raportare caz de
boală transmisibilă◆ în 5 zile de la depistarea cazului
suspect/confirmat.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in
0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt; mso-ansi-language: PT-BR;
mso-bidi-font-family: Arial;" lang="PT-BR">Agentul etiologic este o spirochetă, Borrelia
burgdorferi și se transmite prin</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in
0pt;"><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt; mso-ansi-language: IT;
mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US;
mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial;" lang="IT">muscătura de capusă.
Capusa vectoare cel mai frecvent întâlnită în zona noastră aparține speciei Ixodes ricinus.
Ciclul ei de viață presupune existența a trei gazde, mamifere mari și mici, și trecerea succesivă
din fază de larvă în cea de nimfă și apoi de adult. >>> mai mult</p> <p>◆</p> <p class="MsoNormal"
style="margin: 0in 0in 0pt;">◆</p> <p><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;
mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language:
EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="IT"> </p> <p><span style="font-family:
Arial; font-size: 12pt; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';
mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="IT"> </p>