
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

Pentru persoanele care au tuberculoza multirezistentă la medicamente, tratamentul poate continua pe parcursul a 24 de luni. **Cinci** dintre cele mai des folosite antibiotice sunt: [Rifampicina si izoniazida, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-si-izoniazida-capsule_9018 "Rifampicina si izoniazida, capsule") [Rifampicina, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-capsule_8999 "Rifampicina, capsule") [Pirazinamida, comprimate](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/pirazinamida-comprimate_9013 "Pirazinamida, comprimate") [Etambutol, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/etambutol-capsule_9008 "Etambutol, capsule") [Streptomicina sulfat, flacon injectabil](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/streptomicina-sulfat-flacon-injectabil_10557 "Streptomicina sulfat, flacon injectabil")

Este foarte important să se administreze toate dozele întregi ale medicamentelor recomandate de medic. Acest lucru asigură vindecarea și înalță riscul recidivării (reaparitia bolii) și dezvoltarea rezistenței bacilului la antibiotice.

Dupa perioada de spitalizare pacientul continuă tratamentul la domiciliu. Acesta presupune:

- administrarea corectă a medicamentelor, sub supravegherea atentă a medicului de familie, pentru a împiedica dezvoltarea rezistenței bacteriei
- un regim sanatos care să asigure corpului substanțele necesare organismului de a riposta împotriva bolii. De indicat de asemenea este ajutorul unui dietetician
- repaus cât mai mult, evitarea eforturilor fizice
- acoperirea gurii cu batista în momentul tusei sau a strănutului. În primele două luni de tratament, boala se poate răspândi cu ușurință altora.

Tratament medicamentos

Tratament chirurgical

Profilaxie

OMS apreciază că o treime din populația globului este infectată cu o

6 / 7

Sanatatii ♦ DSP Valcea</p> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0.25in; line-height: 18pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br style="mso-special-character: line-break;" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">♦</p>