

[Pneumonia comunitara](http://www.sfatulmedicului.ro/Pneumonii/pneumonia-comunitara_502)>pneumonia si cancerul pulmonar.
Simptomele tuberculozei active apar treptat si se desfasoara pe o perioada de cateva saptamani sau luni. Pot exista cateva simptome usoare fara ca pacientul sa banuiasca prezenta infectiei.

Simptomele obisnuite sunt:
- tuse insotita de mucus gros, cateodata cu sange (sputa) pe o durata de aproximativ doua saptamani
- batai rapide ale inimii (tahicardie)
- cresterea in volum a ganglionilor limfatici din regiunea gatului
- febra, frisoane si transpiratii in timpul somnului
- oboseala si slabirea fortei fizice
si pierdere in greutate fara motive explicabile
- scaderi ale amplitudinii respiratiei, dureri in piept.
<br style="margin-top: 6px;margin-bottom: 6px;"><br style="margin-top: 6px;margin-bottom: 6px;">⚠</p><p class="MsoNormal" style="background-color:white;margin:0in 0in 0.25in;line-height:18pt;">Persoanele au un risc crescut de a se infecta cu tuberculoza atunci candRiscuri
Persoanele au un risc crescut de a se infecta cu tuberculoza atunci cand
- intra in contact cu cineva care are tuberculoza activa (in casa, la servicii, la scoala)
- ingrijesc persoane care prezinta tuberculoza activa netratata (personalul medical)
- traiesc in conditii de aglomeratie unde pot veni in contact cu oameni care au tuberculoza, cum ar fi cei care lucreaza in penitenciare, in spitale, azile, cazarmele militare, penitenciare , adaposturile pentru oamenii fara locuinta
-au acces precar la ingrijirea medicala, cum ar fi oamenii strazii .

persoane care consuma droguri sau alcool -calatoresc din, sau in regiuni unde tuberculoza este des intalnita, cum ar fi America Latina, Africa, Asia, Europa de Est si Rusia.

Persoanele care au risc de a face tuberculoza sunt testate prin testul cutanat la tuberculina

Persoanele care au risc de a face tuberculoza sunt testate prin testul cutanat la tuberculina

Medicul trebuie contactat de urgenta daca o persoana:

- prezinta simptome (tuse continua insotita de

[febra](http://www.sfatulmedicului.ro/Diverse/febra_4949 "Febra"), [oboseala](http://www.sfatulmedicului.ro/Oboseala-cronica/oboseala_1198 "Oboseala") si [pierdere in greutate](http://www.sfatulmedicului.ro/Diete-de-slabit/pierdere-in-greutate-importanta-servirii-micu-lui-dejun_1483 "Pierdere in greutate: importanta servirii micului dejun") care ar putea fi cauzate de tuberculoza - a fost in contact intim cu cineva care are tuberculoza activa, care poate fi transmisa altora sau cu cineva care ar putea fi banuit a avea tuberculoza

Diagnosticul tuberculozei active pulmonare

Se face prin :

(istoricul bolii)

examinarea fizica a pacientului si descrierea de catre acesta a propriilor simptome

[illegible]

Pentru persoanele care au tuberculoza multirezistentă la medicamente, tratamentul poate continua pe parcursul a 24 de luni. **Cinci** dintre cele mai des folosite antibiotice sunt: [Rifampicina si izoniazida, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-si-izoniazida-capsule_9018 "Rifampicina si izoniazida, capsule") [Rifampicina, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-capsule_8999 "Rifampicina, capsule") [Pirazinamida, comprimate](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/pirazinamida-comprimate_9013 "Pirazinamida, comprimate") [Etambutol, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/etambutol-capsule_9008 "Etambutol, capsule"). [Streptomicina sulfat, flacon injectabil](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/streptomicina-sulfat-flacon-injectabil_10557 "Streptomicina sulfat, flacon injectabil")

Este foarte important să se administreze toate dozele întregi ale medicamentelor recomandate de medic. Acest lucru asigură vindecarea și înalță riscul recidivării (reaparitia bolii) și dezvoltarea rezistenței bacilului la antibiotice.

Dupa perioada de spitalizare pacientul continuă tratamentul la domiciliu. Acesta presupune:

- administrarea corectă a medicamentelor, sub supravegherea atentă a medicului de familie, pentru a împiedica dezvoltarea rezistenței bacteriei
- un regim sanatos care să asigure corpului substanțele necesare organismului de a riposta împotriva bolii. De indicat de asemenea este ajutorul unui dietetician
- repaus cât mai mult, evitarea eforturilor fizice
- acoperirea gurii cu batista în momentul tusei sau a strănutului. În primele două luni de tratament, boala se poate răspândi cu ușurință altora.

Tratament medicamentos

Tratament chirurgical

Profilaxie

OMS apreciază că o treime din populația globului este infectată cu o

[illegible]

Sanatatii ♦ DSP Valcea</p> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0.25in; line-height: 18pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br style="mso-special-character: line-break;" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">♦</p>