

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">TOXIINFECȚIILE ALIMENTARE </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Sunt mai frecvente ♦ sezonul cald si se datoreaza:</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .25in;">- ingestiei de alimente u?or alterabile</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .25in;">- consumului de ap? nepotabil? ca atare sau cu ocazia sc?ld?rilor</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: .25in; text-align: justify; text-indent: -.25in; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .25in;">- m♦nilor nesp?late, vectorilor ?i altele. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Alimentele implicate cel mai frecvent in aparitia bolii sunt preparatele de ou? ?i carne, lactatele, cremele, maionezele, salatele etc.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p> <p>♦</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Semnele de boal? >>> ♦mai mult</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>