

Pediculoza și combaterea ei

Pediculoza este o maladie infecțioasă, determinată de păduchi-paraziți proprii omului (pediculosis).

Păduchele este un ectoparazit, care în afara gazdei umane moare în câteva zile. Se alimentează

e
x
c
lu
s
i
v
cu
s
în
g
e
u
m
a
n
,
p
e
c
are
î
l
s
u
g
e
p
r
i
n
în
t
e
p
ă
t
u
ri
î
n
pi
e
l
e
e

li
m
in
în
d
s
a
li
v
ă.

Păduchele este mobil și se poate mișca foarte repede. O femelă matură poate depune 3-

6
o
u
ă (
l
i
nd
i
n
i
)
p
e zi.

Omul poate fi infestat cu două specii de păduchi:

1. **Pediculus Hominis** care are două subspecii: de cap - **Pediculus hominis capitis** și

d
e
c
o
r
p
-
P
ed
i
cu

I
us
h
o
m
i
n
i
s
c
o
rp
o
r
i
s
.

Aceste două specii anatomic sunt identice, cel de cap avînd doar mărimi mai mici.

2. **Pediculus pubis** (păduchele pubian) este mai mic de cît celelalte 2 subspecii.

Pediculoza de cap se manifestă prin prurit intens, mai ales noaptea, scărpinatul duce la

e
z
i
un
i
ca
r
e
s
e
in
f
ec
t
ează
s

e
c
und
ar
p
r
o
d
u
c
în
d
u
-
s
e
s
u
p
u
r
a
t
i
i
,
c
r
u
st
i
f
i
care,
li
m
fa
d
e
no
p
a
t
i
e
e

t
c.

Păduchele de corp populează tivurile hainelor, provoacă prurit, transmit tifosul exan

t
e
m
a
ti
c
ș
i
feb
r
ăr
e
c
u
r
e
n
t
ă.

Păduchele pubian – se stabilește de regulă în regiunile: perianale, abdomenului, tor

ac
e
l
u
i
,
b
a
r
b
ă,
g
e
n
e,
sp
r

î
n
ce
n
e
p
r
o
v
o
c
î
n
d
p
r
u
r
i
t
ș
i
i
n
f
l
a
m
a
ț
i
e
î
n
re
g
i
un
il
e
m
e
n
ț
i
o
n
a
t

e.
E
st
e
o
f
o
r
m
ă
care
s
e
t
r
a
n
s
m
it
e
d
e
ce
l
e
m
ai
d
e
s
e
o
r
i
p
e
c
a
l
e
s
e
x
u
a

l
ă.

Păduchii se transmit prin contact direct cu persoana afectată și prin intermediul obiect

e
l
o
r
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e:
p
i
e
p
t
e
n
e,
că
c
i
u
l
i
ț
e,
h
a
i
n
e
n
e
s
p
ă
l
a
t

e,
l
e
n
g
er
i
e
d
e
c
o
r
p
p
ș
i
p
a
t
,
bu
r
e
t
e
d
e
b
a
i
ee
t
c.

Tratamentul pediculozei de cap se reduce la spălarea cu șampoane care conțin substanț

e
p
e
d
i
c
u
l
i
c

id
e
:
n
i
tt
i
f
o
r,
p
er
m
e
t
r
i
n
,
m
e
di
f
ox
,
m
e
di
f
o
x
-
f
o
r
t
e,
b
e
n
z
i
l
b
e
n

z
o
a
t
-
20%
.
D
up
ă
p
r
e
l
u
cra
r
e
c
a
pu
l
s
e
î
n
f
ă
s
o
ară
c
u
u
n
ș
t
e
r
g
ar
ti
m
p
d
e

3
0
-
4
0
m
inut
e
a
p
o
i
s
e
s
p
a
l
ă cu
s
ă
pu
n
s
a
u
ș
a
m
po
n
ob
i
șn
u
i
t
,
s
e
c
l
ă
t
e
ș

t
e
cu
a
p
ă
ca
l
d
ă.
Pr
o
c
e
du
r
a
s
e
r
e
p
e
t
ă
p
e
s
t
e
3
-
4
z
i
l
e.

Pentru detașarea lindinilor fixate pe firele de păr se folosește pieptenele des. Desprinder
ea
l
i
n
di

n
il
o
r
p
o
a
t
e
f
i
u
ș
u
ra
t
ă
p
r
i
n
î
n
m
ui
erea
p
ă
r
u
l
u
i
c
u
s
o
lu
ți
e
d
i
l
u
a
t

ă
d
e
oț
et cu
a
p
ă
î
n
p
r
op
o
r
ț
i
e
1
:
1
du
p
ă
ce
c
a
p
u
l
v
a
fi
în
f
ă
ș
u
r
a
t
c
u
u
n
ș

t
e
r
g
a
r
ti
m
p
d
e
1
5
-
2
0
m
in
ut
ea
p
o
i
pi
e
p
t
ă
n
a
t
.
C
on
c
o
m
it
e
n
t
v
o
r
fi
t

ra
t
a
t
e
to
a
t
e
p
e
r
so
a
n
e
l
e
ca
r
e
au
f
os
t
î
n
c
o
n
t
act
c
u
c
e
l afecta
t
.
T
r
a
t
a
m
e

n
t
u
l
p
e
d
i
c
u
l
o
z
e
i
d
e
c
o
r
p
s
e
r
e
d
u
c
e
l
a
d
e
z
i
ns
e
c
t
area
h
a
i
n
e
l
o
r

p
r
i
n
s
p
ă
l
are
î
n
a
p
ă
f
o
ar
t
e
f
i
e
r
b
in
t
e
,
u
r
m
în
d
us
c
area
l
o
r
l
a
c
i
c
lu
l

f
i
e
r
b
i
n
t
e
a
l
u
s
c
ă
t
o
r
u
l
u
i
d
e
h
a
i
n
e
t
i
m
p

de 30 minute și călcarea hainelor cu fierul fierbinte. O metodă eficientă în pediculoza vesti

m
e
n
t
e
l
o
r
e
s
t
e
d
e

z
i
n
s
e
c
t
i
a
l
e
n
g
e
r
i
e
i
p
r
i
n
m
e
t
o
d
a
d
e
e
t
u
v
ă.

Profilactica pediculozei se reduce la respectarea igienei personale, spălarea regulată a
c

p
u
l
u
i
c
u
s
ă
p
u
n
or

§
i
a
p
ă
c
a
l
d
ă,
î
n
g
r
i
j
i
r
e
a
p
ă
r
u
lu
i
p
r
i
n
sp
ă
l
a
r
e
§
i
f
r
i
z
are,
s
c
h

i
m
bu
l
re
gu
l
at
a
l
l
e
n
g
er
i
e
i
d
e
c
o
r
p
ș
i
p
a
t
(
n
u
m
ai
rar
d
e
7
-
1
0
z
i
l
e),
î

n
g
r
i
j
i
r
e
a
o
b
i
e
c
t
e
l
o
r de
i
g
i
e
n
ă.

Un rol important aparține examenului minuțios al copiilor în instituțiile preșcolare și preu
n
iv
er
s
i
t
a
r
e
d
e
c

ă
t
re
a
s
i
st
e
n
t
e
l
e
m
e
di
c
a
l
e
ș
i
e
d
u
c
a
to
r
i
,
ce
c
o
n
t
r
i
bu
i
e
la d
e
p
i
s

t
area
p
re
c
o
ce
ș
i
p
r
e
v
e
ni
r
ear
ă
s
p
î
nd
i
r
i
i
i
n
f
e
s
t
a
ț
i
e
i
p
r
i
n
p
e
d
i
c

u
l
o
zã.

Medic epidemiolog