<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">�</p> <p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">��</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">�</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">��� <em style="mso-bidi-font-style: normal;">Avand in vedere ca in ultima perioada a crescut incidenta cazurilor de varicela dorim sa va facem urmatoarele recomandari </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;">�</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">�� VARICELA</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; margin: 0in 0in 0pt; background: white;">Virusul varicelo � zoosterian se transmite cu usurinta de la o persoana la alta.�� Cel mai frecvent transmiterea bolii se realizeaza pe cale respiratorie, prin intermediul mucoaselor bucale si nazale. De asemenea virusul se poate transmite prin aer, prin stranut sau tuse, de la persoane bolnave. Mai rar, virusul se transmite prin secretiile rezultate din ruperea veziculelor cutanate. Cea mai contagioasa perioada incepe cu 2-3 zile inainte de aparitia eruptiei veziculare si continua in timpul formarii veziculelor� (in general 4-5 zile) </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; margin: 0in 0in 0pt; background: white;">Expunerea la varicela inseamna a fi in preajma unei persoane cu semne prezente de varicela sau daca ii apar dupa 2-3 zile. In plus, persoana care se imbolnaveste de varicela poate sa faca o forma mai severa de boala decat persoana care i-a transmis boala.
Odata cu imbolnavirea se dobandeste imunitate.�� </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">Persoanele care nu au facut boala<span style="line-height: 115%; font-family: "Times New Roman"; color: black; font-size:

13pt; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="IT">�� >>> mai mult</p> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">�</p>