

[Pneumonia comunitara](http://www.sfatulmedicului.ro/Pneumonii/pneumonia-comunitara_502 "Pneumonia comunitara") si

[Fumatul produce cancer pulmonar](http://www.sfatulmedicului.ro/Fumatul-si-efectele-acestuia/fumatul-produce-cancer-pulmonar_521 "Fumatul produce cancer pulmonar").
Simptomele tuberculozei active apar treptat si se desfasoara pe o perioada de cateva saptamani sau luni. Pot exista cateva simptome usoare fara ca pacientul sa banuiasca prezenta infectiei.

Simptomele obisnuite sunt: tuse insotita de mucus gros, cateodata cu sange (sputa) pe o durata de aproximativ doua saptamani - batai rapide ale inimii

Tahicardia supraventriculara - cresterea in volum a

Ganglion limfatic din regiunea gatului

Febra, frisoane si transpiratii in timpul somnului - oboseala si slabirea fortei fizice

Riscuri - pierderea poftei de mancare si pierdere in greutate fara motive explicabile - scaderi ale amplitudinii respiratiei, dureri in piept.

Riscuri

Riscuri

Persoanele au un risc crescut de a se infecta cu tuberculoza atunci cand:
- intra in contact cu cineva care are tuberculoza activa (in casa, la servicii, la scoala)
- ingrijesc persoane care prezinta

Tuberculoza (tbc) - generalitati activa netratata (personalul medical) - traiesc in conditii de aglomeratie unde pot veni in contact cu oameni care au tuberculoza, cum ar fi cei care lucreaza in penitenciare, in spitale, azile, cazarmele militare, penitenciare , adaposturile pentru oamenii fara locuinta - au acces precar la ingrijirea medicala, cum ar fi oamenii strazii

[tusea cronica](http://www.sfatulmedicului.ro/Bolile-aparatului-respirator/tusea-cronica_6233 "Tusea cronica")

, oboseala, febra si

[transpiratii](http://www.sfatulmedicului.ro/Transpiratia/cum-sa-iti-dai-seama-daca-transpiri-mai-mult-decat-este-normal_5768 "Cum sa iti dai seama daca transpiri mai mult decat este normal")

in somn)

rezultatul culturilor de sputa si al testului de sensibilitate la tuberculina la care

rezultatele se interpreteaza dupa 1-6 saptamani deoarece bacteria care produce tuberculoza

creste foarte incet.

Rezierea este indicata in caz de rezultat pozitiv al testului de tuberculina - simptome de tuberculoza, cum ar fi tuse persistenta,

[oboseala](http://www.sfatulmedicului.ro/Oboseala-cronica/oboseala_1198 "Oboseala"), febra sau transpiratii in timpul somnului

reactie nesigura la testul de tuberculina din cauza unui sistem imun deficitar.

Tratamentul medicamentos (TSS)

In general, dupa doua saptamani de tratament cu antibiotice nu mai este posibila transmiterea infectiei catre alte persoane , adica bolnavul nu mai este contagios.

Oprirea tratamentului medicamentos poate cauza intarzierea vindecarii si de asemenea reaparitia bolii. Reaparitiile pot surveni la 6 - 12 luni de la intreruperea tratamentului, in aceste cazuri fiind necesara reinceperea acestuia . De asemenea, neadministrarea tratamentului pana la capat (oprirea lui intr-un anumit punct), poate duce la cresterea capacitatii bacteriei de a dezvolta rezistenta, facand tratamentul ulterior mai dificil)

Fara tratament, forma activa a tuberculozei poate produce complicatii serioase, cum ar fi cavitati in parenchimul pulmonar. Aceste zone bolnave ale plamanului, pot cauza sangerari si pot cauza suprainfectii cu alte tipuri de bacterii si formarea de abcese (cavitati pline cu puroi)

un orificiu care se formeaza intre caile aeriene apropiate (fistula bronho-pleurala) - dificultati in respiratie din cauza cailor aeriene blocate.

Mai multe antibiotice sunt folosite in acelasi timp pentru a trata tuberculoza. Antibioticele se administreaza sub forma injectabila sau de pastile.

Pentru persoanele care au tuberculoza multirezidenta la medicamente, tratamentul poate continua pe parcursul a 24 de luni. **Cinci** dintre cele mai des folosite antibiotice sunt:

[Rifampicina si izoniazida, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-si-izoniazida-capsule_9018)

[Rifampicina, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/rifampicina-capsule_8999)

[Pirazinamida, comprimate](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/pirazinamida-comprimate_9013)

[Etambutol, capsule](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/etambutol-capsule_9008)

[Streptomicina sulfat, flacon injectabil](http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/streptomicina-sulfat-flacon-injectabil_10557)

Este foarte important sa se adminstreze toate dozele intregi ale medicamentelor recomandate de medic. Acest lucru asigura vindecarea si inlatura riscul recidivarii (reaparitia bolii) si dezvoltarea rezistentei bacilului la antibiotice.

Dupa perioada de spitalizare pacientul continua tratamentul la domiciliu. Acesta presupune:

administrarea corecta a medicamentelor, sub supravegherea atenta a medicului de familie , pentru a impiedica dezvoltarea rezistentei bacteriei

-un regim sanatos care sa asigure corpului substantele necesare organismului de a riposta impotriva bolii. De indicat de asemenea este ajutorul unui dietetician

-repaus cat mai mult , evitarea eforturilor fizice

-acoperirea gurii cu batista in momentul tusei sau a stranutului. In primele doua luni de tratament, boala se poate raspandi cu usurinta altora.

Tratament medicamentos

Tratament chirurgical

Profilaxie

OMS apreciaza ca o treime din populatia globului este infectata cu o

Sanatatii ♦ DSP Valcea</p> <p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0in 0in 0.25in; line-height: 18pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" /><br style="mso-special-character: line-break;" /></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 10pt;">♦</p>