

Gripa face parte dintr-o categorie mai mare de boli virale respiratorii. Astfel, exista o serie de virusuri care circula in aceeași perioadă a anului, dau simptomatologie asemănătoare gripei dar se deosebesc de aceasta prin evoluția mai ușoară. Puteti recunoaște o viroză respiratorie datorată altor tipuri de virusuri decât virusurile gripale după debutul mai lent al bolii (începe ușor cu usturimi în gât, nas infundat, dureri de cap) cât și după evoluția mai ușoară a bolii. Gripa se transmite ușor de la om la om datorită condițiilor favorizante cum ar fi aglomerările urbane, colectivitățile de copii și adolescenți.

Definiție: Este o boală acută. Infecțioasă, foarte contagioasă, produsă de virusul gripal. Se manifestă prin simptome respiratorii și fenomene toxice generale, putând evolua uneori spre forme grave. Sezonul rece favorizează bolnavii și epidemiile de gripă (iarnă, începutul primăverii), dar boala poate să apară și alte anotimpuri.

Transmitere : Direct prin tuse sau strănut; Indirect prin obiecte proaspăt contaminate (batistă, prosop, veselă, etc.)

Contagiozitatea este mare, dar de scurtă durată (2 - 4 zile de la debutul bolii).

Manifestare : Boala debutează brusc, la 1 - 2 zile de la contactul cu omul bolnav. Simptome : Febră 39 - 40 grade Celsius; Frisoane; Cefalee (dureri de cap); Dureri musculare; Astenie fizică (slăbiciune); Congestionarea faringelui (roșu gât); Răgușală până la afonie (pierderea vocii); Tuse frecventă, uscată, obositoare; Înăpătenă (lipsa poftei de mâncare); Grețuri.

Vărsături;

Tratament

Formele comune se tratează la domiciliu, cu repaus la pat, antitermice (paracetamol). Nu se ia acid acetic salicilic (ASPIRINA), aceasta poate favoriza apariția sindromului Reye.

Consultați medicul de familie în cazul gripei severe și cea complicată se tratează în spital: susținerea funcțiilor vitale (respiratorie și cardio-vasculară), antibiotice în caz de suprainfecție bacteriene

Prevenire

normal;">a) Recomandari generale pentru prevenirea imbolnavirilor prin gripa:
 1. evitarea aglomerarilor umane
 2. Evitarea, pe cat posibil, a contactului cu persoanele bolnave;
 3. Spalarea mainilor tot timpul, mai ales dupa suflarea nasului si venirea in contact cu persoane bolnave,
 4. Omul bolnav se izoleaz? de restul familiei ♦tr-o camer? corespunz?toare din punct de vedere igienic (luminoas?, aerisit?, suficient de ♦c?lzit? 24 ♦ 26 grade Celsius).
 5. Bolnavul va folosi batiste igienice ♦ caz de tuse sau str?nut
 6. Aerisirea incaperilor sau a birourilor cu mentinerea unei temperaturi de 18-20 grade C,
 7. Mentinerea la domiciliu a copiilor bolnavi pentru evitarea transmiterii bolii in comunitate.
 8. Evitarea vizit?rii bolnavilor sau suspec?ilor de grip?.
 <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> b) Vaccinarea antigripal?
 Cea mai eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor de gripa este vaccinarea antigripala.
 Aceasta vaccinare protejeaza persoana vaccinata numai fata de virusurile gripale circulante in sezonul respectiv, cuprinse in vaccin, si nu fata de toate tipurile de virusuri care dau simptome asematoare gripei dar au evolutie mai usoara. Vaccinarea este recomandata tuturor persoanelor incepand cu varsta de 1 an.
 Acesta trebuie sa fie efectuata in stare buna de sanatate, singura contraindicatie la vaccinare fiind alergia la proteine de ou.
 Perioada in care este bine sa fie administrat vaccinul este in presezon, adica lunile octombrie-decembrie ale fiecarui an. Vaccinul utilizat este diferit de la un sezon la altul, iar compozitia acestuia este stabilita de Organizatia Mondiala a Sanatatii care transmite tuturor producatorilor formula vaccinala. <br style="mso-special-character: line-break;" /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> </p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Grupele de populatie la risc pentru programele speciale de vaccinare sunt reprezentate de :
 a) persoane cu risc crescut de complicatii, aici fiind incluse persoanele in varsta sau cu handicap, cele institutionalizate, adultii si copiii cu afectiuni cronice (cardiovasculare, pulmonare, metabolice, renale si cu imunosupresie), persoanele cu varste peste 65 de ani, copiii si adolescentii (intre 6 luni si 18 ani) carora li se administreaza medicatie pe termen lung cu aspirina
 b) persoane, care prin natura ocupatiei, pot transmite gripa celor din categoria cu risc crescut, respectiv medicii, cadrele sanitare medii, personalul auxiliar din spitale si unitatile sanitare ambulatorii (cu prioritate a celor din maternitati, sectiile de terapie intensiva, statii de salvare), salariatii institutiilor de ocrotire a copiilor si batranilor si cei ai unitatilor de bolnavi cronici, membrii familiilor (inclusiv copiii) care includ persoane in categoria cu risc crescut de complicatii ale gripei.
 c) persoanele infectate cu HIV, persoanele care calatoresc la tropice sau in

2 / 3

emisfera sudica, precum si vaccinarea gravidelor si a copiilor mici.

d) In cazul gravidelor, vaccinul gripal se poate administra pe toata durata sarcinii. De retinut ca acesta nu da reactii adverse si nu provoaca malformatii ale fatului. Vaccinul poate fi administrat si pe perioada alaptarii.

Contraindicatii:

Vaccinul gripal este contraindicat persoanelor cu manifestari alergice severe la oua. In cazul pacientilor cu boli febrile sau orice infectii acute, administrarea vaccinului trebuie amanata pana la vindecarea acestora.

Reactii adverse :

Vaccinarea poate determina aparitia, la 6-12 ore, a unor reactii secundare locale (la 30%-50% dintre vaccinati): durere, roseata (eritem), intarirea zonei respective (induratie), vanataie (echimoza), care dispar spontan. Totodata, pot aparea reactii generale (la 1%), precum febra sub 39 de grade Celsius, de scurta durata, care se remite cu antitermice, dureri de cap, astenie. Foarte rar pot aparea reactii alergice severe precum urticaria, rinita, socul anafilactic.

Administrare:

Vaccinul gripal se administreaza, numai de catre un cadru medical, intramuscular sau subcutanat. Pentru achizitionarea acestuia se recomanda prescriptia medicala. Vaccinul gripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri, dar in locuri diferite.

Intocmit

PROMOVAREA SANATATII

DR

GANDACIOIU CRISTIANA